


Météo de l'herbe du 11 Juillet 2017

Après un début de saison marqué par des courbes de croissance d'herbe très fluctuantes en lien avec les disponibilités en eau, la période de pâturage des regains permet d'offrir une herbe "fraîche" de qualité, plus favorable à la production laitière. Les repousses de légumineuses en pâture l'été assurent toujours un minimum de production à valoriser.



Repères conduite du troupeau : du 3 au 10 Juillet 2017

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	20,2	21,8	20,6	22,6	18,9	22,2
TB Moyen (g/kg)	36,0	36,8	36,8	38,2	37,0	37,7
TP Moyen (g/kg)	31,8	32,0	31,7	32,2	31,6	32,5
Valorisation ration de base (kg)	11,2	12,1	13,0	14,0	11,7	11,9
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	54,6	56,0	48,5	45,9	45,1	62,9
g de concentrés / kg de lait	197	199	169	155	163	212

Article Chambre d'Agriculture du Jura rédigé par Sylvie BOMBRUN (Brevet)

Bilan des données météo de 2017 comparées à 2016 pour les stations de Pontarlier, Champagnole et Lons

La Chambre d'Agriculture du Jura récupère les données météo de 3 stations depuis 2 ans. Il est intéressant de comparer ces données au regard de quelques stades repères au niveau de la pousse de l'herbe (à partir du 1er février, base 0-18°).

Repère des 200°: il correspond au démarrage de la végétation et au stade de préconisation pour l'apport d'azote en sortie d'hiver sur prairies.

Pour 2017, la somme des 200° a été atteinte au 12/03 pour Champagnole et Pontarlier et au 27/02 pour Lons. On avait entre 11 et 20 jours d'avance par rapport à 2016 pour les 3 stations : 20 j pour Pontarlier, 17 j pour Champagnole et 11 j pour Lons.

Repère des 800°: il correspond au stade début épiaison (repère pour la date de fauche) pour les prairies à bonne productivité.

Pour 2017, la somme des 800° a été atteinte au 20/05 pour Champagnole et Pontarlier et au 24/04 pour Lons. On avait entre 9 et 16 jours d'avance par rapport à 2016 : 14 j pour Pontarlier, 9 j pour Champagnole et 16 j pour Lons.

Les repères de températures ne peuvent pas être déconnectés des fenêtres de beau temps pour pouvoir faucher et donc de la pluviométrie. Les foins ont été faits tardivement en 2016 alors qu'on était globalement au bon stade en 2017.

Pour la pluviométrie au 2/07 :

- Pontarlier : 550 mm (1110 mm en 2016 à la même date)
- Champagnole : 650 mm (1080 mm en 2016)
- Lons : 410 mm (840 mm en 2016)


On enregistre quasiment la moitié de la pluviométrie de 2016 à la même date.

Groupe Herbe Franche-Comté


Réalisé avec le soutien financier de :



Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

