


## Coup de frein d'été !

Avec les coups de chaleur, les repousses sont quasi nulles et le manque d'eau se fait cruellement sentir en prairies. La production laitière accuse une baisse également. L'apport de fourrages d'appoint ou la mise aux regains parfois anticipée sont nécessaires. Retour de la météo de l'herbe fin Août.



## Repères conduite du troupeau : du 9 au 16 juillet 2018

	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	21,0	22,8	21,8	24,3	19,6	22,8
TB Moyen (g/kg)	36,0	37,3	36,9	38,1	36,8	37,7
TP Moyen (g/kg)	31,1	31,4	31,6	32,5	31,3	31,8
Valorisation ration de base (kg)	12,1	10,0	14,3	13,7	11,7	13,1
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	54,2	70,5	46,0	58,9	54,8	53,6
g de concentrés / kg de lait	193	244	159	196	180	189


## Point de vue de l'éleveur du GAEC des Pâquerettes – A Publy

Nous en sommes au 4<sup>ème</sup> tour de pâturage. L'utilisation du fil avant permet d'avoir une maîtrise plus fine des refus et de la quantité d'herbe donnée à nos 45 vaches. Elles disposent en ce moment de 43 ares/ vache et produisent en moyenne 17 L de lait. Notre parcellaire étant actuellement très éclaté, nous pourrions augmenter la surface de pâturage jusqu'à 52 ares par vache. Avec une complémentation de 2,5kg de mélange céréalière et de tourteau 28, nous leur donnons du foin et de l'herbe une fois par jour (soit ¼ de la ration quotidienne en fourrage grossier) depuis fin juin.


Propos recueillis par Floriane MARSAL – Conseillère à Interbio FC

Groupe Herbe Franche-Comté

### Courbe de croissance de l'herbe en plaine



### Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



### Courbe de croissance de l'herbe en montagne

