


Météo de l'herbe du 9 octobre 2018

Fin de saison en vue !

Une fois de plus, l'absence de précipitations aura sans doute définitivement condamné le retour de croissance au-delà d'un simple reverdissement cet automne. Seule consolation : des températures encore clémentes et des sols porteurs pour finir la saison au pâturage avec plus ou moins de lait selon l'état d'avancement des vèlages, mais un niveau de complémentation en grammes/litre qui reste élevé.



Repères conduite du troupeau : du 1^{er} au 8 octobre 2018


	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Lait moyen / vache traite (kg)	20,3	21,4	22,0	22,2	17,3	22,8
TB Moyen (g/kg)	37,8	41,5	38,6	41,3	39,7	40,8
TP Moyen (g/kg)	33,7	34,4	34,1	33,6	33,1	34,4
Valorisation ration de base (kg)	9,9	11,1	12,4	10,0	5,4	9,4
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	67,9	66,0	58,0	78,0	92,4	82,8
g de concentrés / kg de lait	244	243	202	253	326	269

Point de vue de l'éleveur du GAEC des Pâquerettes à Publy


Dès juillet, le foin constituait 1/3 de la ration journalière. Au fil de la saison sa proportion n'a fait qu'augmenter pour arriver aujourd'hui à la moitié de la ration afin de s'adapter aux conditions climatiques. Les vaches continuent à pâturer, même s'il y a peu de repousse. Nous avons décidé de les faire pâturer sur 15 ha de parcelles éloignées habituellement dédiées à la fauche. La récolte de regain n'a été que de un tiers par rapport aux autres années. Pour pallier ce manque, nous avons acheté du foin de luzerne. Propos recueillis par F. Marsal -Interbio FC

Groupe Herbe Franche-Comté

Courbe de croissance de l'herbe en plaine



Courbe de croissance de l'herbe sur les plateaux



Courbe de croissance de l'herbe en montagne

