


Même si la croissance de l'herbe est encore active cet automne, plus particulièrement en plaine, pensez déjà aux transitions alimentaires sur 15 jours à trois semaines en prévision du rationnement à la mise à crèche.



## Repères conduite du troupeau : du 18 au 25 septembre 2017




	39 Foin	39 Ensilage	25-90 Foin	25-90 Ensilage	70 Foin / Enrubannage	70 Ensilage
Laït moyen / vache traite (kg)	21.2	21.6	22.1	23.2	19.7	24.1
TB Moyen (g/kg)	37.6	40.9	38.3	39.4	39	40.2
TP Moyen (g/kg)	34.0	33.9	34.1	33.8	34	34.2
Valorisation ration de base (kg)	11.6	11.5	13.5	13.2	10.1	12.1
Coût HFPE (€ / 1000 kg lait)	57.7	62.2	51.8	59.1	63.6	70.1
g de concentrés / kg de lait	205	227	178	180.7	234.3	231.2

### Point de vue de l'éleveur :

#### Témoignage du Gaec Tinguely des Rousses :

L'année 2017 a été propice à la pousse de l'herbe et ceci s'est ressenti sur la conduite du pâturage et les résultats laitiers du troupeau des 60 vaches. Cela a permis de produire sans concentrés pendant toute la saison avec une moyenne d'environ 22 kg de lait par vache. La production a diminué vers 15 kg pendant les 3 semaines où les vaches ont pâturé les parcelles situées dans le Risoux, de moindre qualité. Tout ceci est possible avec une salle de traite ambulante. Des concentrés sont distribués aujourd'hui aux vaches qui viennent de vêler. Les vaches vont finir de pâturez les parcelles des Rousses avant de repartir au Risoux.

Témoignage Chambre d'Agriculture du Jura recueilli par Sylvie BOMBRUN (Brevet)



Réalisé avec le soutien financier de :



**RÉGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTÉ**